BULLETIN DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
2e Série — Tome 39 — N° 5, 1967 (1968), pp. 851-860.

NOUVEAUX PTEROPLIINI *DES COLLECTIONS DU MUSÉUM DE PARIS* *(Col. Cerambycidae Lamiinae)*

Par S. BREUNING

Pterolophia (s.s.) **bituberculatithorax**, n. sp.

En ovale allongé. Antennes un peu moins longues que le corps, assez densément frangées, le scape court et très fort, le troisième article un peu plus long que le quatrième, beaucoup plus long que le scape, les articles 4 à 8 pourvus d'une petite épine apicale interne. Tubercules antennifères distants, mais un peu saillants. Joues moitié plus longues que les lobes inférieurs des yeux. Pronotum transverse, imponctué, pourvu de deux dépressions transversales, une antérieure et une postérieure et de deux hauts tubercules discaux prémédians. Élytres sensiblement plus larges que le pronotum à la base, très convexes, largement subtronqués à l'apex, assez densément et grossièrement ponctués sur le tiers basilaire, plus finement sur le deuxième tiers et pourvus, chacun, d'un tubercule dentiforme discal basilaire suivi d'une assez longue crête longitudinale discale élevée surmontée d'un grand fascicule de poils, de deux petits fascicules de poils blancs postmédians, l'un rapproché de la suture, l'autre rapproché du bord latéral, et de nombreux très petits fascicules de poils entre la crête et les deux fascicules postmédians et dans la partie médiane de quelques bourrelets discaux longitudinaux incurvés. Pattes à longs poils dressés.

Brun foncé, couvert de pubescence brun rougeâtre entremêlée par places d'un peu de jaunâtre. Le tiers apical de l'élytre à pubescence jaune paille.

Long. : 13 mm ; larg. : 5 à 6 mm.

Type de Bornéo : Pontianak, 1898. — Un paratype *idem*.

Dans mon tableau de détermination des espèces du genre *Pterolophia* Newm. s.s. (*Ent. Arb. Mus. Frey*, XVI, 1965, p. 178) cette espèce s'intercale près du n° 237 en différant des espèces mentionnées sous les nos 238-240 par la présence de hauts tubercules sur le pronotum.

Pterolophia (s.s.) **nigromaculipennis**, n. sp.

En ovale allongé. Antennes un peu moins longues que le corps, éparsément frangées en dessous, le troisième article un peu plus long que le

quatrième, sensiblement plus long que le scape. Joues au moins trois quarts plus longues que les lobes inférieurs des yeux. Tête et pronotum densément et très finement ponctués. Pronotum transverse, très convexe. Élytres longs, très convexes, arrondis à l'apex, densément ponctués, assez grossièrement dans la moitié antérieure, finement dans la moitié postérieure, chacun avec une petite bosse discale postbasilaire surmontée d'un fascicule de poils. Pattes garnies de longs poils dressés.

Brun foncé, couvert de pubescence brune. Pronotum, avec deux très petites taches circulaires blanches rapprochées du bord antérieur et de la ligne médiane, de chaque côté une tache médiane blanchâtre vague à la limite du disque et de la partie latérale et deux petites taches jaune-blanchâtre rapprochées de la ligne médiane. Écusson à bords jaune pâle. Sur chaque élytre une étroite bande transversale prémédiane blanchâtre descendant obliquement de la suture en direction de la marge externe, mais développée seulement dans la moitié suturale, une petite tache latérale postmédiane blanche, une petite tache suturale préapicale blanche et quelques taches noires entourant cette tache suturale en forme de demi-cercle. Antennes à pubescence brun foncé, la base extrême des articles 3 à 11 à pubescence blanchâtre.

Long. : 7 mm ; larg. : 2 mm 2/3.

Type de Malaisie : Perak, leg. W. Doherty.

Se place près de *consularis* Pasc.

Pterolophia (s.s.) **subchapaensis**, n. sp.

Proche de *chapaensis* Pic, mais les antennes frangées en-dessous, leur troisième article sensiblement plus long que le quatrième, beaucoup plus long que le scape, les élytres non mouchetés de blanc, mais pourvus, chacun, de quelques petites taches blanches en forme d'une bande transversale postmédiane parcourant la moitié suturale, et le dernier segment abdominal noir sauf sur les côtés.

Type de Malaisie : Perak, Gounong-Boubou, 1 100 m alt., leg. W. Doherty.

Pterolophia (s.s.) **ochreomaculipennis**, n. sp.

Allongé, trapu. Antennes un peu moins longues que le corps, le troisième article un peu plus long que le quatrième, sensiblement plus long que le scape. Joues presque deux fois plus longues que les lobes inférieurs des yeux. Tête imponctuée. Pronotum fortement transverse, très éparsément et très finement ponctué. Élytres longs, très convexes, arrondis à l'apex, densément ponctués, assez grossièrement dans la moitié antérieure, finement dans la moitié postérieure, pourvus, chacun, d'une bosse discale postbasilaire surmontée d'un fascicule de poils et de deux fines crêtes longitudinales discales peu accusées.

Brun foncé, couvert de pubescence brun jaunâtre entremêlée de brun, d'ochracé et de blanchâtre. Élytres à pubescence brune entremêlée de blanchâtre, sur chaque élytre deux bandes transversales ondulées ochracées, une prémédiane et une postmédiane. Antennes à pubescence brune, les trois quarts basilaires du quatrième article à pubescence blanche, l'extrême base des articles 5 à 11 à pubescence blanchâtre.

Long. : 15 mm ; larg. : 6 mm.

Type de Bhutan, leg. L. Durel, 1899.

Se place près de *bifasciculata* Breun.

Pterolophia (s.s.) **subbicarinata**, n. sp.

Allongé. Antennes aussi longues que le corps, peu densément frangées en dessous, le troisième article un peu plus long que le quatrième ou que le scape. Lobes inférieurs des yeux un peu moins longs que les joues. Tête et pronotum très densément et très finement ponctués. Pronotum transverse, pourvu de deux petites tubercules discaux. Élytres longs, échancrés à l'apex (l'angle sutural bien distinct, l'angle marginal étiré en un petit lobe triangulaire pointu), densément ponctués, assez grossièrement dans la moitié antérieure, assez finement dans la moitié postérieure, pourvus, chacun, d'une courte crête longitudinale discale postbasilaire surmontée de poils et d'une fine crête discale postmédiane surmontée en arrière de courts poils noirs. Pattes garnies de longs poils dressés blanchâtres.

Brun foncé à pubescence brun rougeâtre. Élytres avec une assez large bande transversale blanche située un peu après le milieu. Les trois-quarts basilaires du quatrième article des antennes et la base extrême des articles 3 et 5 à 11 à pubescence blanche.

Long. : 8 mm ; larg. : 2 1/2 mm.

Type de Bhutan : Maria Basti, 1899.

Se place à côté de *bicarinata* Breun.

Pterolophia (s.s.) **subfulvisparsa**, n. sp.

Allongé. Antennes un peu moins longues que le corps, assez densément frangées en-dessous de poils très courts, le troisième article un peu plus long que le quatrième ou que le scape. Lobes inférieurs des yeux un peu moins longs que les joues. Tête et pronotum imponctués. Pronotum fortement transverse. Élytres longs, convexes, étroitement obliquement tronqués à l'apex (l'angle marginal proéminent), densément ponctués, peu grossièrement dans la moitié antérieure, finement dans la moitié postérieure, pourvus, chacun, d'une légère bosse longitudinale discale postbasilaire et d'une fine crête longitudinale discale postmédiane.

Rouge foncé à pubescence brun rougeâtre clair entremêlée de gris sur le front. De chaque côté du disque du pronotum une grande tache cir-

culaire brun rougeâtre foncé. Élytres marbrés de brun rougeâtre foncé et de blanchâtre, cette dernière pubescence plus étendue sur le tiers sutural de la moitié postérieure. Le troisième article des antennes, le tiers apical du quatrième et les articles 5 à 11 sauf à la base à pubescence brun rougeâtre foncé.

Long. : 8 mm ; larg. : 2 1/2 mm.

Type de Malaisie : Perak, Gounong-Boubou, 1 100 m alt., leg. W. Doherty.

Se place près de *fulvisparsa* Gah.

Pterolophia (s.s.) **persimiloides**, n. sp.

Proche de *persimilis* Gah., mais le scape plus mince dans son tiers apical, le pronotum encore plus large et plus finement ponctué, les élytres plus grossièrement ponctués dans la moitié postérieure et pourvus, chacun, d'une courte et fine crête longitudinale discale postmédiane légèrement saillante, toute la pubescence d'un brun rougeâtre un peu plus clair, le pronotum sans taches, les élytres ornés seulement dans le quart apical de très petites taches blanchâtres, la bande transversale postmédiane blanche moins large, les articles antennaires non annelés de blanc à la base, mais le tiers apical du sixième article, tout le septième article et la moitié basilaire du huitième article à pubescence blanche.

Type de Chine : prov. de Szetschouan : Mosy-Mien, 1897.

Pterolophia (s.s.) **bottangensis**, n. sp.

Allongé. Antennes beaucoup moins longues que le corps, éparsément frangées, le troisième article beaucoup plus long que le quatrième ou que le scape. Joues moitié plus longues que les lobes inférieurs des yeux. Tête et pronotum à ponctuation très fine et extrêmement dense. Pronotum fortement transverse. Élytres longs, convexes, tronques à l'apex, densément peu finement ponctués et pourvus, chacun, d'une bosse allongée discale postbasilaire surmontée d'un fascicule de poils noirs et de deux légers bourrelets longitudinaux discaux dans la partie postmédiane.

Brun foncé à pubescence brun rougeâtre. Sur chaque élytre de très petites taches noirâtres le long de la suture, une bande transversale postmédiane jaune blanchâtre peu large n'atteignant pas la suture et en arrière de cette bande une tache discale noire rapprochée de la suture. Base des articles antennaires 3, 4, 6 et 7 et tout le cinquième article à pubescence blanche.

Long. : 9 1/2 mm ; larg. : 3 mm.

Type de Bhutan : Paedong, leg. Durel, 1913.

Proche de *persimilis* Gah.

Pterolophia (s.s.) **yunnana**, n. sp.

Allongé. Antennes beaucoup moins longues que le corps, frangées en-dessous de poils très courts, le scape peu long et peu fort, le troisième article beaucoup plus long que le quatrième ou que le scape, le quatrième beaucoup plus long qu'un des articles suivants. Tubercules antennifères peu saillants. Joues deux fois et demie plus longues que les lobes inférieurs des yeux. Front et pronotum transverses. Tête et pronotum très densément et très finement ponctués. Élytres longs, convexes, arrondis à l'apex, densément ponctués, assez grossièrement sur les trois-quarts antérieurs, très finement sur le quart apical, pourvus, chacun, d'une bosse discale postbasilaire surmontée d'un assez grand fascicule de poils et une fine crête longitudinale postmédiane surmontée également de poils.

Brun foncé, couvert de pubescence brun rougeâtre. Sur chaque élytre deux taches blanchâtres assez grandes, une médiane sublatérale et une préapicale couvrant la moitié suturale. Les articles antennaires six et sept à pubescence blanchâtre.

Long. : 6 mm 1/2 ; larg. : 1 mm 3/4.

Type de Chine : province de Yunnan, région de Loa-nan, 1932.

Dans mon tableau de détermination du genre *Pterolophia* Newm. s.s. (*Ent. Arb. Mus. Frey*, XVI, 1965, p. 174) cette espèce s'intercale près du n° 177 en différant de *pseudocarinata* Breun. surtout par les articles 6 et 7 des antennes à pubescence blanchâtre.

Pterolophia (s.s.) **cambodgensis**, n. sp.

En ovale allongé. Antennes beaucoup moins longues que le corps, à peine frangées, le troisième article beaucoup plus long que le quatrième ou que le scape. Joues presque deux fois plus longues que les lobes inférieurs des yeux. Tête et pronotum densément et très finement ponctués. Pronotum fortement transverse, pourvu de deux dépressions transversales, une antérieure et une postérieure et de deux très petits tubercules discaux prémédians. Élytres longs, très convexes, arrondis à l'apex, densément ponctués, peu finement dans la moitié antérieure, très finement dans la moitié postérieure ; sur chacun un petit tubercule discal basilaire suivi d'une bosse discale postbasilaire surmontée d'un fascicule de poils, et un petit fascicule de poils discal postmédian.

Brun foncé, couvert de pubescence brun rougeâtre. Sur la moitié postérieure de l'élytre une large bande longitudinale suturale jaunâtre qui envoie avant le fascicule postmédian un étroit rameau latéralement jusqu'au-delà du milieu du disque. Antennes marbrées de brun et de grisâtre.

Long. : 5 mm ; larg. : 2 mm.

Type du Cambodge, région de Chichreng, leg. G. Thomas, 1912.

Pterolophia (s.s.) **subrubra**, n. sp.

Proche de *rubra* Breun., mais le troisième article des antennes sensiblement plus long que le scape, le pronotum sans dépressions transversales, les élytres arrondis à l'apex, ponctués assez grossièrement dans la moitié antérieure, presque sans lignes discales convexes et, sur chaque élytre, une grande tache latérale posthumérale jaunâtre peu nette.

Long. : 6 mm ; larg. : 2 mm.

Type du Perak, leg. W. Doherty.

Pterolophia (s.s.) **parabaiensis**, n. sp.

Proche de *baiensis* Pic mais les articles antennaires 5 à 9 sans épine apicale, la bosse discale postbasilaire de l'élytre plus élevée et dans la moitié postérieure de l'élytre deux fines crêtes longitudinales bien accusées, les tibias garnis de longs poils dressés et sur chaque élytre une grande tache basilaire brun rougeâtre clair située entre l'écusson et la bosse postbasilaire.

Long. : 11 mm ; larg. : 4 mm.

Type du Perak : Gounong Boubou, leg. W. Doherty.

Pterolophia (s.s.) **transversefasciatipennis**, n. sp.

Proche de *transversefasciata* Breun., mais le pronotum très finement ponetué, les élytres grossièrement ponctués dans toute la moitié antérieure, pourvus, chacun, d'un assez haut tubercule discal postbasilaire et d'une courte mais assez haute crête discale postmédiane, tout le pronotum à pubescence d'un brun assez foncé sauf trois étroites bandes longitudinales ochracées en sa partie médiane et les antennes à pubescence brun foncé sauf les trois quarts antérieurs du quatrième article qui sont couverts de pubescence blanche.

Long. : 6 mm ; larg. : 2 1/3 mm.

Type de Malaisie : Perak, leg. W. Doherty.

Pterolophia (Hylobrotus) indistinctemaculata, n. sp.

Proche de *humerosopunctata* Breun., mais les antennes un peu moins longues que le corps, les lobes inférieurs des yeux seulement un peu plus longs que les joues, les élytres ponctués un peu plus fortement, les points plus régulièrement alignés, et la livrée différente.

Brun rougeâtre à pubescence jaune paille entremêlée de brun rougeâtre, la pubescence sur les deux tiers antérieurs des élytres densément entremêlée surtout sur les deux tiers suturaux de blanchâtre de façon à ce

que la pubescence foncière ne subsiste qu'en forme de nombreuses (ca. sept) étroites bandes longitudinales.

Long. : 10 mm ; larg. : 4 mm.

Type de Bornéo occidental : Satipas près Singawang, leg. J. B. Ledru, 1897.

Pterolophia (Mimoron) ropicoides, n. sp.

Allongé. Antennes aussi longues que le corps, frangées en-dessous, le scape assez long, le troisième article sensiblement plus long que le quatrième ou que le scape, lobes inférieurs des yeux un peu moins longs que les joues. Tête et pronotum à ponctuation très fine et extrêmemcnt dense. Pronotum fortement transverse. Élytres longs, convexes, très légèrement élargis après le milieu, arrondis à l'apex, très densément ponctués, peu finement dans la moitié antérieure, finement dans la moitié postérieure ; sur chaque élytre une petite bosse allongée discale postbasilaire peu élevée.

Rouge foncé, couvert de pubescence brun rougeâtre entremêlée sur les élytres d'un peu de gris et de brun foncé ; sur chaque élytre une très étroite bande transversale médiane blanchâtre légèrement ondulée.

Long. : 5 mm ; larg. : 2 mm.

Type de Bhoutan : Maria Basti, leg. L. Durel.

Se place près de *phungi* Pic.

Pterolophia (Paramimoron) subropicoides, n. sp.

Allongé. Antennes beaucoup moins longues que le corps, non frangées en-dessous, le troisième article sensiblement plus long que le quatrième, aussi long que le scape. Joues de moitié plus longues que les lobes inférieurs des yeux. Tête et pronotum à ponctuation très fine et extrêmement dense. Pronotum fortement transverse. Élytres longs, arrondis à l'apex, très densément ponctués, peu finement dans la moitié antérieure, finement dans la moitié postérieure.

Rouge à pubescence brun clair. Articles antennaires 3 et 4 rouge foncé, les articles 5 à 11 à pubescence blanchâtre sur la base.

Long. : 6 mm ; larg. : 1 mm 3/4.

Type de Chine : Kuy-tsheou, leg. R. P. J. Chaffanjon, 1903.

Pterolophia (Gibbopraonetha) quadrigibbosipennis, n. sp.

Proche de *quadrigibbosa* Pic, mais les lobes inférieurs des yeux seulement un peu moins longs que les joues, le front aussi large que haut, les élytres par toute leur étendue plus grossièrement ponctués, la crête postbasilaire beaucoup plus élevée, la crête postmédiane très haute et

surmontée d'un grand fascicule de poils, les taches blanches se trouvent seulement en arrière de la crête postmédiane dans la moitié suturale.

Long. : 11-12 mm ; larg. : 4-4 mm 1/2.

Type de Chine : province du Szetschouan : Ouy-Sy. — Un Paratype. *Idem.*

Pterolophia (Pilosipraonetha) dohertyana, n. sp.

Proche de *pilosipes* Pic, mais sur chaque élytre les crêtes longitudinales effacées après le fascicule postbasilaire jusques après le milieu de la longueur de l'élytre où se trouve une crête longitudinale un peu plus haute et la pubescence foncière du corps blanchâtre.

Long. : 9 mm ; larg. : 3 mm.

Type de Malaisie : Perak, Gounong-Boubou, 1 100 m alt., leg. W. Doherty.

Mispila (Dryusa) coomani, n. sp.

Allongé. Le scape court, peu finement ponctué, le troisième article des antennes beaucoup moins long que le quatrième, sensiblement plus long que le scape. Front et pronotum peu densément et peu finement ponctués. Élytres très longs, peu densément et grossièrement ponctués, les points plus ou moins alignés, devenant plus fins dans la partie apicale.

Brun foncé à pubescence brun rougeâtre foncé. Sur chaque élytre une ligne blanche transversale fortement zigzaguée au début du tiers apical et trois très petites taches blanches nettes : une discale prémédiane rapprochée du bord latéral et deux préapicales, une suturale et une latérale ; en plus à la fin du tiers basilaire une ligne transversale zigzaguée blanche est indiquée dans la moitié suturale.

Long. : 8 mm ; larg. : 2 mm 2/3.

Type du Tonkin : Hoa Binh, leg. A. de Cooman.

Pterolophia (Ale) rubiensis, n. sp.

Proche de *subfasciata* Gah., mais le front non ponctué, le pronotum assez grossièrement ponctué, sur chaque élytre une assez haute crête longitudinale discale postbasilaire et une longue crête longitudinale postmédiane, toutes deux surmontées de poils, la pubescence brun rougeâtre, les élytres avec trois taches jaunâtres en commun : une très grande cordiforme basilaire, une moins large transversale postmédiane et une très grande mais moins nette couvrant la moitié suturale du quart apical, la partie médiane du quatrième article des antennes et l'extrême base des articles 5 à 11 à pubescence jaunâtre.

Long. : 9 mm ; larg. : 3 mm.

Type de Birmanie : Ruby mines, 1 200-2 300 m alt., leg. Doherty, 1880.

Pterolophia (Ale) ochreosticticollis, n. sp.

Modérément allongé. Antennes un peu moins longues que le corps, le troisième article sensiblement plus long que le scape. Lobes inférieurs des yeux sensiblement moins longs que les joues. Tête densément et très finement ponctuée. Pronotum fortement transverse, très convexe, très densément et très finement ponctué ; Élytres longs, très convexes, arrondis à l'apex, très densément ponctués, assez grossièrement dans la moitié antérieure, finement dans la moitié postérieure, pourvus, chacun, d'une petite bosse allongée discale postbasilaire surmontée de poils. Pattes garnies d'assez longs poils dressés.

Noir, à pubescence brune. Tête et pronotum densément parsemés de petites taches ochracées. Écusson à pubescence ochracée. Élytres à pubescenee gris clair, chacun avec une très petite tâche ochracée basilaire à eôté de l'écusson, quelques taches discales brun foncé dans le tiers apieal et quelques taches blanches dans cette région. Dessous et pattes à pubescence brun grisâtre. Antennes à pubescence brun foncé.

Long. : 8-9 mm ; larg. : 3-3 mm 1/2.

Type de Malaisie : Perak, leg. W. Doherty. — Un paratype *idem*.

Mesosella (Cylindrostyrax) bhutanensis, n. sp.

Proche de *quadriplagiata* Breun., mais les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que les joues, le pronotum très finement ponctué et les élytres sans taches brun foncé mais ornés d'une assez large bande transversale médiane blanche.

Long. : 9 mm ; larg. : 3 mm.

Type de Bhutan : Mara Basti, leg. L. Durel.

Cyardium malaccense, nov. sp.

Proche de *cribrosum* Pasc., mais les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que les joues, le vertex presque sans sillon longitudinal, le pronotum sans tubercule latéro-inférieur antérieur, les élytres subtronqués à l'apex et la livrée différente.

Brun foncé, couvert de pubescence rougeâtre, le disque du pronotum et les élytres assez densément marbrés de blanchâtre. Le métasternum à pubescence jaune paille, cette pubescence remontant sur le bord latéral de l'élytre au quart basilaire de l'élytre. La partie basilaire du troisième article des antennes et les deux tiers basilaires du quatrième article à pubescence blanche, l'apex du troisième article, le tiers apical du quatrième article et les articles 5 et 6 (les articles suivants manquent) noirs.

Long. : 16 mm ; larg. : 6 mm.

Type une ♀ de la Presqu'île de Malacca : Errington de la Croix, leg. P. Chapé, 1899.

Trichoniphona, n. gen.

Très long. Antennes modérément fines, aussi longues que le corps (♀), assez densément frangées de poils peu longs ; le scape court et fort, le troisième article à peine plus long que le quatrième, plus de moitié plus long que le scape, les articles suivants diminuant fortement en longueur. Tubercules antennifères distants l'un de l'autre et peu saillants. Yeux assez finement facettés, subdivisés, les lobes inférieurs aussi hauts que larges. Front plus large que haut. Pronotum fortement transverse, très convexe, légèrement rétréci vers le bord antérieur, trilobé à la base, à bords latéraux arrondis, pourvu de deux fins sillons transversaux, un antérieur et un postérieur. Élytres très longs, plus de trois fois plus longs que la tête et le pronotum réunis, parallèles, très convexes, un peu plus larges que le pronotum, échancrés à l'apex, frangés au tiers apical de poils modérément longs. Tête rétractile. Saillie prosternale aussi haute que les hanches, tronquée verticalement à son bord antérieur. Saillie mésosternale tronquée verticalement à son bord antérieur. Métasternum de longueur normale. Cavités coxales intermédiaires ouvertes. Pattes de longueur moyenne, les fémurs claviformes, les tibias intermédiaires sans sillon dorsal, les crochets divergents. Élytres garnis de courts poils dressés peu serrés.

Type *albomarmorata* Breun. Ce genre se place parmi les *Pteropliini* à côté du genre *Niphona* Muls.

Dans mon tableau de détermination des genres des *Pteropliini* asiatiques (*Ent. Arb. Mus. Frey*, XIII, 1962, p. 382) ce genre s'intercale près du n° 122 en différant de *Trichecsemotes* Breun. par l'absence de fascicule de poils sur les élytres, etc.

Trichoniphona albomarmorata, n. sp.

Lobes inférieurs des yeux moitié plus longs que les joues. Tête assez éparsément et peu finement ponctuée. Pronotum densément, très grossièrement et rugueusement ponctué et pourvu au milieu d'un court sillon longitudinal postmédian. Élytres assez densément et assez grossièrement ponctués et entremêlés de points encore plus gros, assez largement échancrés à l'apex (l'angle sutural proéminent, l'angle marginal étiré en un court et large lobe triangulaire). Parties latérales du dessous éparsément et finement ponctuées.

Brun foncé, couvert de pubescence brun jaunâtre. Élytres très densément marbrés de blanc. Dessous et fémurs à pubescence blanchâtre et parsemés de nombreuses très petites taches brun clair. Tarses à pubescence brun foncé. Tiers apical des articles antennaires 3 et 4 et les articles 5-11 à pubescence d'un brun assez foncé, la base des articles 5-11 à pubescence blanchâtre.

Long. : 20 mm ; larg. : 6 1/2 mm.

Type une ♀ de Paedong, région Darjeeling, Chasseurs indigènes, 1934.